

Stikskader

Undgå stikskader på apoteket

Hvor går det typisk galt? Det gør det når vi modtager returmedicin ved skranken fra private kunder, via chauffør fra hjemmeplejen, fra tandlæger og læger m.fl.

Hvordan går det galt? Det gør det når vi stikker hånden ned i en pose, hvor vi ikke kan se indholdet, når vi griber om posen - også ved sortering af returmedicin kan vi få stikskader!

Forebyg stikskader - Skranke!

Modtag kun *returmedicin* i klare plastposer (apoteket kan evt. udlevere disse).

Kanyler og skarpe genstande modtages kun i godkendte kanylebokse.



- Spørg om returmedicinen indeholder kanyler og skarpe genstande.
- Kontroller indholdet visuelt ved at holde posen op og se igennem den - tag fat øverst! - undgå at gribe om posen eller holde under den!
- Er der emner der skal sorteres fra, så lad kunden selv sortere - udlever passende emballage fx kanyleboks og sørg for, at boksen er lukket korrekt.

Returmedicin placeres i kasser/beholdere beregnet til medicin-affald.

Kanylebokse placeres i emballage beregnet til disse - særskilt emballage.



Håndtering af medicinaffald mv. se vejledning om farligt gods på apoteker.crecea.dk

Forebyg stikskader - Modtage/sortere!

Når apoteket modtager returmedicin fra hjemmepleje, plejehjem og institutioner:

- Information til hjemmeplejen om sikker modtagelse af returmedicin i klare poser og kanylebokse.
- Chaufføren bør kun modtage returmedicin, der er korrekt emballeret.
- Visuel kontrol foretages af chauffør eller på apoteket.
- Chaufføren skal overholde krav om kørsel med kanylebokse.
- Ved fejl kontaktes afhentningsstedet for at undgå gentagelse.

Hvis personalet på apoteket sorterer returmedicin, er der krav til sikkerheden:

- Ved tømning af pose til bakke eller bord skal det foregå under udsugning til det fri, hvis der er fare for medicinstøv.
- Der skal anvendes stikfaste handsker og forklæde.
- Arbejdspladsen regnes som fast arbejdsplads og skal opfylde kravene til disse. Se At-vejledning A.1.11.

Forebyggelse - Ved returmedicin:

- Klare skriftlige retningslinjer for håndtering af returmedicin på apoteket.
- Informer om retningslinjerne og gentag dem jævnligt.
- Tag proceduren op i forbindelse med APV og/eller kvalitetsstyring system og juster efter behov.

Hvis du stikker dig på en kanyle!

Konsekvens:

- Bekymring om mulig smitte.
- Kontakt til læge eller skadestue vedrørende undersøgelse for smitte - HIV og Hepatitis (B og C).
- Eventuelt vaccinationer - fra dag 0 og op til 12 måneder.

Udsættelse for blod og legemsvæsker fra muligt HIV-, hepatitis B- eller C-inficerede personer indebærer altid en smitterisiko.

Ved uheld i forbindelse med håndtering af brugte kanyler anbefales derfor:

- *Stik- eller snitsår forårsaget af brugte kanyler*
Vaskes straks grundigt med vand og sæbe. Pensles i 2 omgange med jodspiritus 2,5% eller klorhexidinsprit 0,5% eller hospitalssprit 70%.
- *Stænk med blod på beskadiget hud (fx kraftig eksem eller psoriasis)*
Følg samme procedure som ovenfor.
- *Stænk med blod i øjne eller andre slimhinder*
Skyl straks med rigeligt vand.
- *Stænk med blod på ubeskadiget hud*
Vask straks grundigt med vand og sæbe.
- *Ved spild eller stænk af blod*
Overfladen rengøres med hypoklorit, klorammin, glutaraldehyd eller alkoholer.

I alle tilfælde: KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE

- For at få foretaget en første blodprøve til undersøgelse for HIV- og hepatitis B og C-antistoffer (af forsikringsmæssige årsager).
- For eventuelt at blive vaccineret mod hepatisk B, difteri og stivkrampe.

Hos læge/på skadestue foretages en risikovurdering i forhold til din risiko for om du er smittet med HIV-virus, og evt. - hvis man vurderer risikoen som stor – iværksætte behandling med samme medicin, som benyttes til HIV-smittede. Behandlingen skal i så fald iværksættes hurtigt - helst inden for 1-2 timer.

Forebyggelse af stikskader - Hvordan?

Det er vigtigt at forebygge stikskader - det skal ske ved:

- Undervisning og oplysning til personalet om sikre arbejdsrutiner og brug af personlige værnemidler (stikfaste handsker).
- Kritisk gennemgang af arbejdspladsen i forhold til indretning, udstyr og arbejdsgange.

Anmeldelse af stikskade - Arbejdsulykke

Uheldet skal anmeldes til Arbejdstilsynet som en arbejdsulykke, hvis det giver anledning til uarbejdsdygtighed/fravær i en dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. Fraværet behøver ikke være i umiddelbar tilknytning til ulykkesdagen. Af forsikringsmæssige årsager anbefaler CRECEA altid, at uheldet under alle omstændigheder anmeldes til forsikringsselskabet – også i forhold til godtgørelse af udgifter til evt. vaccinationer. Anmeldelse til forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsyn foretages elektronisk, via EASY på www.virk.dk

Sker der stikskader er det vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen kender anmeldelsesproceduren og at anmeldelsen indeholder de rigtige oplysninger. Drøft uheldet i arbejdsmiljøgruppen - hvordan undgår vi gentagelser!

Udarbejd en skriftlig dokumentation/registrering af hændelsesforløbet kan på et senere tidspunkt være af stor betydning – med følgende indhold:

- Hvad er der sket? Hvor på kroppen skar man sig og hvor dybt?
- Hvor og hvornår skete skaden?
- Hvem er involveret?
- Hvordan?
- Blev der brugt værnemidler?
- Hvad er der efterfølgende sket for den tilskadedkommende?
- Hvordan forebygger vi lignende uheld?